УДК 575.13:595.773.4

ПОЛНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА *D. LITTORALIS* (DIPTERA: DROSOPHILIDAE): СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ГЕНОМОВ В ГРУППЕ ДРОЗОФИЛ *VIRILIS*

С.Ю. Сорокина¹, Б.В. Андрианов², В.Г. Митрофанов¹¹Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН, г. Москва;²Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН, г. Москва;

e-mail: svetlana_ibr@mail.ru)

Представлен анализ полной последовательности митохондриального (мт) генома *D. littoralis*. Приведены его основные характеристики, размер, нуклеотидный состав, последовательность генов, а также степень давления стабилизирующего отбора на разные участки генома. Обсуждены особенности структуры белок-кодирующих генов и генов тРНК. Приведена структура некодирующих районов: контрольного района и межгенных спейсеров мтДНК группы *virilis*. Найдены фрагменты мт-генов *atp6* и *cox3* в ядерном геноме *D. virilis*. Эволюционная история митохондриальных и ядерных последовательностей этих генов указывает на то, что процесс образования мт-псевдогенов идет в настоящее время и связан с активностью ретротранспозонов.

Ключевые слова: митохондриальный геном, нуклеотидная последовательность, межгенный спейсер, псевдоген, ретротранспозон *Tv1*, *Drosophila littoralis*.

D. littoralis является одним из одиннадцати видов-двойников группы *virilis*. Данная группа на протяжении многих лет служит объектом исследований в области микроэволюции и видообразования [1]. Вид *D. littoralis* широко распространен на территории Евразии, где образует генетически гетерогенные природные популяции, структура которых хорошо изучена на основании инверсионного [2] и аллозимного [3] полиморфизмов, а также полиморфизма мтДНК [4].

Результаты и обсуждение

Мт-геном *D. littoralis* представляет собой кольцевую молекулу размером 16,017 п.о. с суммарным содержанием А + Т — 76,2%. Порядок генов такой же, как и у других видов дрозофил [5]. МтДНК содержит 37 генов (13 генов белков внутренней мембраны, 2 гена рРНК и 22 гена тРНК) и один протяженный некодирующий участок (контрольный район). Гены расположены на обеих нитях и не содержат интронов. Межгенные последовательности составляют всего 1,6% мт-генома *D. littoralis*.

Сравнение мт-геномов *D. littoralis* и *D. virilis* (GenBank: VK006340) позволило оценить давление отбора для индивидуальных генов. Мы рассчитали соотношение синонимичных (Ks) и несинонимичных (Kn) замен для каждого гена (рис. 1). Значения Kn/Ks для всех 13 белок-кодирующих генов меньше единицы, что указывает на давление стабилизирующего отбора. Наиболее изменчивыми оказались гены *nad6*, *nad3*, *nad4L*, наименее изменчивым — *cox1*.

Все белок-кодирующие гены, кроме *cox1*, имеют канонические старт-кодона АТТ (метионин) или АТГ (изолейцин). Открытая рамка считывания гена *cox1* начинается с неканонического кодона ТСГ. Было показано, что у других видов дрозофил рамка трансляции также начинается с неканонического кодона (Т/С)СГ [6]. Шесть генов, *nad2*, *cox1*, *atp8*, *atp6*, *cox3* и *nad3*, имеют канонические кодона терминации трансляции ТАА или TAG. У остальных семи генов кодона терминации неполные: Т или ТА. Гены с неполными стоп-кодонами

Рис. 1. Соотношение несинонимичных и синонимичных замен (Kn/Ks) для 13 белок-кодирующих генов при сравнении мт-геномов *D. littoralis* и *D. virilis*

Рис. 2. ПЦР-идентификация мт псевдогена, ассоциированного с ретротранспозоном *Tv1*. А — *atp6/Tv1*, размер ожидаемого фрагмента — 900 п.о.; Б — *cox3/Tv1*, размер ожидаемого фрагмента — 950 п.о. 1, 2 — ♂ *D. littoralis*; 3, 4 — ♀ *D. littoralis*; 5, 6 — ♂ *D. virilis*; 7, 8 — ♀ *D. virilis*

у *D. littoralis*, как правило, непосредственно граничат с генами тРНК. Полный стоп-кодон, напротив, найден в генах, которые граничат с некодирующим спейсером.

По первичной последовательности, вторичной структуре и антикодонам все 22 мт-гена тРНК *D. littoralis* соответствуют генам тРНК других дрозофил [6]. Все тРНК имеют типичную структуру клеверного листа за исключением тРНК^{Ser}(AGN). Эта тРНК имеет простую DHU-петлю без стебля. Необычная структура не влияет на функцию молекулы, так как кодон AGN, узнаваемый данной тРНК, широко используется в митохондриальном геноме *D. littoralis*.

Контрольный район (КР) — единственный протяженный некодирующий район мт-генома дрозофилы. Данный район насыщен А/Т нуклеотидами (А+Т-район) и содержит точки начала репликации и промоторы для обеих нитей мт-генома. КР локализован между геном 12S рРНК и геном тРНК^{Ile} *D. littoralis* и имеет длину 1023 п.о. В составе КР выявляется две поли-Т последовательности: одна вблизи гена тРНК^{Ile}, другая на противоположной нити в центральной части КР. Экспериментально показано, что эти поли-Т блоки расположены непосредственно в точках начала репликации обеих нитей мт-генома у четырех видов дрозофил (*D. yakuba*, *D. obscura*, *D. albomicans* и *D. virilis*) [7]. В центральной части КР между поли-Т блоками идентифицирована высоко консервативная последовательность длиной 275 п.о., известная как HCSE [7].

При сравнении HCSE *D. littoralis* и *D. virilis* величина *p*-дистанции равна $0,05 \pm 0,01$, что в 3 раза меньше, чем величина *p*-дистанции, рассчитанная для всего КР в целом. В области КР, примыкающей к гену 12SpРНК, выявлена последовательность из четырех G-нуклеотидов (G-остров), которая может являться частью сигнальной последовательности для терминации синтеза минорной нити мтДНК [7].

На долю межгенных спейсеров приходится всего 20% некодирующей мтДНК *D. littoralis* (250 п.о.). Самый протяженный спейсер в мтДНК *D. littoralis* обнаружен между генами *atp6* и *cox3* и имеет длину 45 п.о.

Наличие данного спейсера является характерной особенностью мтДНК дрозофил группы *virilis*. Мы определили нуклеотидную последовательность этого спейсера и прилежащих фрагментов *atp6* и *cox3* у 9 видов дрозофил группы *virilis*. Размер спейсера в группе *virilis* зависит от числа повторов (ТА)_n и ко-

Рис. 3. Эволюционные взаимоотношения в группе *virilis*, основанные на последовательностях мт-генов. Дендрограмма построена методом минимальной эволюции в MEGA4.1.; А — фрагмент мт-гена *atp6* длиной 261 п.о., соответствующий позициям 4478—4738 мт-генома *D. virilis* (GeneBank:VK006340) и мт-псевдоген (NUMT) *atp6*; Б — фрагмент мт-гена *cox3* длиной 301 п.о., соответствующий позициям 4791—5091 мт-генома *D. virilis* (GeneBank:VK006340) и мт-псевдоген (NUMT) *cox3*; *Cvi* — пересеваемая клеточная линия 79f7Dv3g *D. virilis*

леблется между 29 п.о. (*D. kanekoi*) и 75 п.о. (*D. laci-cola*). Экспансия (ТА)_n, характерная для дрозофил группы *virilis*, позволяет рассматривать межгенный спейсер *atp6/cox3* как горячую точку изменчивости мт-геномов дрозофил этой группы.

Ранее нами было показано, что 8-нуклеотидная последовательность 5'-АТАТАТАТ-3' фланкирует хромосомные копии специфичного для группы *virilis* ретротранспозона *Tv1* [8]. Следовательно, район повторов (ТА)_n между генами *atp6* и *cox3* может служить сайтом интеграции *Tv1*. Мы предположили, что если возможны транспозиции *Tv1* между ядерным и мт геномами, то есть вероятность обнаружить фрагменты мтДНК, прилегающие к сайту интеграции *Tv1*, в ядерном геноме. Для проверки этой гипотезы мы разработали две пары праймеров для ожидаемой последовательности мт-фрагмента, содержащего гены *atp6/cox3* с инсерциями *Tv1*. Положительные результаты получены только на ДНК самцов *D. virilis* (рис. 2). Клонирование полученных ПЦР-фрагментов в *pJemT* (Promega) и секвенирование отдельных клонов подтвердило их химерную

(*Tv1*-мтДНК) природу. Полученные фрагменты мт-генов не имеют рамки считывания. Этот результат позволяет картировать мт-псевдоген *atp6/cox3* на Y-хромосоме *D. virilis*.

Мы провели филогенетический анализ фрагментов генов *atp6* (261 п.о.) и *cox3* (301 п.о.) у дрозофил группы *virilis*, включая последовательности мт-псевдогенов (рис. 3). Дендрограммы, построенные с помощью модели минимальной эволюции, хорошо согласуются с известной филогенией дрозофил группы *virilis* [1]. Последовательности псевдогенов *D. virilis* кластеризуются с предковыми мт-последовательностями *D. virilis*, что указывает на их недавнее происхождение.

* * *

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 08-04-00958-а) и государственной программой "Генофонды и генетическое разнообразие".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Throckmorton L.H.* The *virilis* species group // The genetics and biology of *Drosophila* / Eds. M. Ashburner, H.L. Carson, J.N. Thompson. London: Academic Press, 1982. 3b. P. 227—296.
2. *Митрофанов В.Г., Полуэктова Е.В.* Инверсионный полиморфизм в природной популяции *Drosophila imeretensis* Sokolov (*D. littoralis* Meig.) // Генетика. 1982. Т. 18. № 11. С. 1849—1855.
3. *Гончаренко Г.Г., Митрофанов В.Г., Корочкин Л.И.* Изучение генотипической структуры *Drosophila imeretensis* Sokolov (*D. littoralis* Meigen) в географически разделенных популяциях Краснодарского края и Белоруссии // Докл. АН СССР. 1984. Т. 279. № 1. С. 216—219.
4. *Андрянов Б.В., Сорокина С.Ю., Мюге Н.С., Резник Н.Л., Митрофанов В.Г.* Популяционная динамика митохондриального полиморфизма в природной популяции *Drosophila littoralis* // Генетика. 2008. Т. 44. № 2. С. 195—201.
5. *Clary D.O., Wolstenholme D.R.* The mitochondrial DNA molecule of *Drosophila yakuba*: Nucleotide sequence, gene organization, and genetic code // J. Mol. Evol. 1985. Vol. 22. N 3. P. 252—271.
6. *Montooth K., Abt D., Hofmann J., Rand D.* Comparative genomics of *Drosophila* mtDNA: Novel features of conservation and change across functional domains and lineages // J. Mol Evol. 2009. Vol. 69. N 1. P. 94—114.
7. *Saito S., Tamura K., Aotsuka T.* Replication origin of mitochondrial DNA in insects // Genetics. 2005. Vol. 171. N 4. P. 1695—1705.
8. *Andrianov B.V., Zakharyev V.M., Reznik N.L., Gorelova T.V., Evgen'ev M.B.* Gypsy group retrotransposon *Tv1* from *Drosophila virilis* // Gene. 1999. Vol. 239. N 1. P. 193—199.

Поступила в редакцию
25.04.10

COMPLETE MITOCHONDRIAL GENOME SEQUENCE OF *D. LITTORALIS* (DIPTERA: DROSOPHILIDAE): COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MITOCHONDRIAL GENOMES IN *DROSOPHILA VIRILIS* SPECIES GROUP

S.Yu. Sorokina, B.V. Andrianov, V.G. Mitrofanov

An analysis of the complete sequence of *D. littoralis* mitochondrial genome (mt-genome) is presented. The basic characters of the mt-genome, such as size, nucleotide composition, genes order, as well as a degree of purifying selection pressure on different parts of the mt-genome are reported. The features of protein-coding genes and tRNA genes are discussed. The structure of mtDNA control region and intergenic spacers in the *virilis* group are presented. The fragments of mitochondrial genes *atp6* and *cox3* were found in the nuclear genome of *D. virilis*. The evolution history of mitochondrial and nuclear genes data indicates that mitochondrial gene transfer to the nucleus is a recent event and connected to the activity of retrotransposons.

Key words: *mitochondrial genome, nucleotide sequence intergenic spacer, Tv1 retrotransposone, Drosophila littoralis.*

Сведения об авторах

Сорокина Светлана Юрьевна — канд. биол. наук, мл. науч. сотр. лаборатории генетики Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН. Тел. 7(499)135-87-81; e-mail: svetlana_ibr@mail.ru

Андрянов Борис Витальевич — канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаборатории сравнительной генетики животных Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН. Тел. 7(499)135-11-30; e-mail: andrianovb@mail.ru

Митрофанов Владимир Григорьевич — докт. биол. наук, проф., зав. лабораторией генетики Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. Тел. 7(499)135-87-81.